



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВИДИН

гр.Видин 3700 ул."Цар Симеон Велики" № 76

Директор – 60 16 95, Факс – 60 16 97

Web address: <http://www.rzi-vidin.net>, E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

Изх. № 702 / 16.03.2017г.

гр. Видин

До

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно заключенията от 2016 г. на Европейския Регионален верификационен комитет на Световната здравна организация (СЗО) по елиминация на морбили и рубеола 24 от 53 европейски държави вече са достигнали елиминация на морбили и също толкова държави са елиминирали рубеола. Въпреки това двете заболявания остават ендемични в редица части на Европейския регион на СЗО.

В световен мащаб, за периода 2000-2015 г. СЗО съобщава 79 % намаление на смъртните случаи от морбили. Въпреки това всеки ден в света почти 400 деца умират от морбили.

За период 1 ноември 2015 г. - 31 октомври 2016 г. държавите от Европейския съюз са съобщили 3 037 случая на морбили. С най-голям брой на заболялите са Румъния (1 011), Италия (728) и Великобритания (569), като диагнозата морбили е лабораторно потвърдена в 72 % от случаите. Във възрастовата структура на заболяването, 40 % от случаите на морбили са при деца под 5 години, а 29 % - при лица над 20 годишна възраст. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група до 1 година (55,4 ‰ и при децата на 1 - 4 години (43,6 ‰). По отношение на имунизационния статус на заболялите, 81 % от тях са неимунизирани, 8 % са имунизирани с 1 доза, 4 % са с данни за имунизация с 2 и повече дози и 7 % са с неизвестен имунизационен статус. Най-голям брой на случаи на морбили с неизвестен имунизационен статус са отчетени при заболялите лица над 30 г. Поради ненавършена имунизационна възраст, най-много не ваксинирани деца (98 %) има сред кърмачетата, които са най-уязвими по отношение на усложненията от заболяването и са най-добре защитени от колективния имунитет при поне 95 % имунизационен обхват с 2 дози морбилна ваксина. За периода са съобщени 7 смъртни случая от морбили, 6 в Румъния и 1 във Великобритания, от които 4 са при деца под 12 месеца и 3 случая при лица с придружаващи заболявания.

В допълнение, към 03.03.2017 г. са съобщени 3 196 случая на морбили в Румъния, в резултат на продължаващото разпространение на заболяването в страната от края на септември 2016 г.

Във връзка е гореизложеното и с цел недопускане разпространение на морбили на територията на страната, е необходимо:

1. Всички общопрактикуващи лекари да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили. Откритите неимунизирани незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията.
2. Да се насочи вниманието на всички лекари, работещи в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, към ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация,

диагностика и лечение.

3. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и при преценка от негова страна за извършване на серологично изследване (серум и урина), хоспитализация и лечение.
4. При съмнение за заболял от морбили следва незабавно да се уведоми РЗИ – Видин, дирекция „НЗБ“ за предприемане на необходимите противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ГЕРГАНА ДЖАМБОВА
Директор на РЗИ - Видин

